

# Naloxona para Prevención de Sobredosis

nombre del paciente

fecha de nacimiento

dirección del paciente

ciudad, estado, código postal del paciente

Rx

nombre del prescriptor

dirección del prescriptor

ciudad, estado, código postal del prescriptor

número de teléfono del prescriptor

Naloxone HCl 1 mg/mL  
2 x 2 mL as pre-filled Luer-Lock needless syringe  
(NDC 76329-3369-1)

Refills: \_\_\_\_\_

2 x Intranasal Mucosal Atomizing Device (MAD 300)

Refills: \_\_\_\_\_

For suspected opioid overdose, spray 1mL in each nostril.  
Repeat after 3 minutes if no or minimal response.

Pharmacist: Call 1-800-788-7999 to order MAD 300.

la firma del prescriptor

fecha

Detach for patient

## Cómo Evitar Sobredosis

- Sólo tome medicamentos recetados a usted
- No tome más de las instrucciones

- Llame a un médico si el dolor empeora
- Nunca mezcle medicamentos para el dolor con alcohol
- Evite las pastillas para dormir la hora de tomar medicamentos para dolor

- Deshágase de las no utilizadas medicamentos
- Guarde su medicina en lugar seguro
- Aprender a utilizar naloxona

- Enseñe a su familia + amigos cómo responder a una sobredosis



## ¿Están respirando?

Los signos de una sobredosis:

- La respiración lenta o superficial
- falta de aire al dormir o ronquido raro
- Piel pálida o azulada
- Ritmo cardíaco lento, presión arterial baja
- No se despierta o responder (nudillos frotar sobre el esternón)

## Llame al 911 para obtener ayuda

Todo lo que tienes que decir:  
"Alguien no responde y no está respirando."  
Dale dirección clara y la ubicación.



## La aerovía

Asegúrese de que no hay nada dentro de la boca de la

## Respiración boca a boca






Oxígeno salva vidas. Respire por ellos.  
Una mano en la barbilla, incline la cabeza hacia atrás, nariz pizca cerrada.  
Hacer un sello sobre la boca y respirar  
1 respiración cada 5 segundos  
Pecho debería aumentar, no el estómago



## Preparar naloxona

¿Son mejores? ¿Se puede contraer la naloxona y prepararlo con la suficiente rapidez que no lo harán por mucho tiempo sin su ayuda para respirar?

PrescribeToPrevent.org



Source: HarmReduction.org

## Evaluar + soporte

- Continuar con la respiración de rescate
- Dar a otros 2 pulverizaciones de naloxona en 3 minutos y si no hay una mínima o la respiración o la capacidad de respuesta
- La naloxona desaparece en 30-90 minutos
- Confórtalos; retirada puede ser desagradable
- Busque atención médica de ellos y ayudarles a que no utilizan más los opiáceos inmediato
- Anime a los sobrevivientes a buscar tratamiento si sienten que tienen un problema

